

Soluciones de seguridad de Tampa Bay
safetysolutionscpr.com
727-458-3473

RCP para la comunidad y el lugar de trabajo

Alerta de acceso y concurren: (recordar estos pasos le mostrarán a través de rescate con seguridad también darle más confianza creando un mejor resultado)

- 1** Acceso para seguridad de escena; verificación de posibles riesgos.

- 2** Agitar ambos hombros y gritar OK Mira escuchar y sentir durante 5-10 segundos buscando aliento

- 3** llaman al 911 y recuperar AED si está disponible

- 4** Si no hay circulación empezar compresiones aplicar

- 5** AED si disponible escuchar los mensajes de voz
(Compresiones deben no se detiene mientras se está conectados pastillas cuando hay 2 o más rescatadores)

- 6** inmediatamente reanudación las compresiones después de un choque y siguen las instrucciones de voz

Causas de la muerte: detención respiratoria cardiaca, cáncer, ahogamiento, sobredosis de drogas, traumas,

Señales de advertencia de ataque al corazón: Molestia en el pecho, leve a severa puede incluir dolor o malestar en uno o tanto brazos, espalda, cuello, mandíbula o estómago. Falta de aliento, con o sin pecho malestar. Otros signos pueden incluir romper un sudor frío, náusea o mareo. Confusión Denegación o sensación de destino Tratamiento: Ayudar A administrar la glicerina Nitro (dilata los vasos sanguíneos) aspirina (diluye la sangre) O2 si capacitados Administrar Sublingual (bajo la lengua)

Señales de advertencia de trazo: Entumecimiento repentino o debilidad de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Confusión repentina, problemas para hablar o comprensión. Problemas repentinos en uno o ambos ojos. Repentinos problemas para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación. Cefalea súbita con sin una causa conocida. (Si usted o alguien con usted tiene uno o más de estos signos, llame al 911 y no retrasar!)

Para identificar un trazo: pedir paciente a sonreír, levante ambos brazos directamente fuera de persona y repetir un simple frase (si el paciente no puede realizar cualquiera de estas tareas, llame al 911 y no retrasar!)

Paro cardíaco ocurre inmediatamente y sin previo aviso. Aquí están los signos: pérdida repentina de capacidad de respuesta (no responde a las escuchas en los hombros). No hay respiración normal (no se hace la víctima un respiración normal cuando inclinar la cabeza arriba y verificación durante al menos cinco segundos). Si estas señales de paro cardíaco, decir a alguien que llame al 9-1-1 y conseguir un AED y comenzar CPR inmediatamente. Si fue testigo de la caída y son los únicos con un adulto que tiene estas señales de paro cardíaco, llame al 9-1-1 y obtener un AED (si hay alguno disponible) antes de comenzaron CPR. (Utilice un AED tan pronto como llega). (colapso un-witnessed proporcionar 2 minutos de CPR antes de llamar a 911 y recuperar un AED n)

Begin CPR: Establecer apatía (agitar ambos hombros y shout usted aceptar llamar **911 y AED se aplica si está disponible**)

R: abrir la inclinación de las vías respiratorias - cabeza Chin levantar para comprobar respiración

B: ver escuchar y sentir durante 5-10 segundos buscando aliento
Si necesita dar 2-1 segundo respiraciones y buscar el aumento de pecho

C: circulación si entrenados, compruebe la existencia de pulso, si no buscar otros signos de circulación como movimiento, gimiendo y piel rosa

(Si no aumentan el pecho re-tilt y vuelva a intentarlo, que seguro no ventilar más que pondrá exceso presión en el pecho y el corazón, poner en peligro la circulación) si no hay circulación, comenzar a pecho compresiones en 100 tarifa por minuto, dos manos en el centro del pecho, el esternón, entre la línea de pezón. Comprimir abajo 1 ½ a 2 pulgadas para adultos y ½ a 1/3 la profundidad de los lactantes y los niños.

(En los adultos es común crack o dislocar costillas, tenemos que presionar más crear suficientes circulación)

Infantil: 0-1 años comprimen ½ -1/3 la profundidad de los dedos pecho dos entre los pezones en el esternón

Infantil: 1-8 años comprimir ½ -1/3 profundidad de pecho con 1 o 2 manos entre pezones sobre el esternón

Adulto: 8 y por encima de dos manos en el centro del pecho, el esternón, entre la línea de pezón.

(Después de 5 ciclos de 2 respiraciones y 30 compresiones repita las constantes de los pacientes, si no hay signos vitales continuar CPR hasta que llegue la ayuda o y AED viene disponible)

Automatizado de desfibriladores externos (AED) de aplicar temprano si fue testigo; Si no se aplican después de 2 minutos de CPR Siga las indicaciones

para el choque, que seguro que saben uno está tocando el paciente. Después de un choque de CPR para continuar 2 minutos CPR escucha de mensajes le guiará a través el rescate desfibrilador externo automatizado (AED) aplicar principios si fue testigo; Si no se aplican después de 2 minutos de CPR Siga las indicaciones para el choque, que seguro que saben uno está tocando el paciente. Después de un choque de CPR para continuar 2 minutos CPR escucha de mensajes le guiará a través de rescate

(Recuerde que su seguridad es lo primero, no hacer a ventilar y no en comprimir, Mantener 100 compresiones un minuto, trabajo en equipo y cambiar a cuando alguien se vuelve a cansado para hacerlo correctamente)
(Recuerde que su seguridad es lo primero, no hacer a ventilar y no en comprimir, Mantener 100 compresiones un minuto, trabajo en equipo y cambiar a cuando alguien se vuelve a cansado para hacerlo correctamente)